




องค์ความรู้เรื่องอ้อย



แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อยและสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาล



พื้นที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2557/58	
ภาค	พื้นที่ปลูกอ้อย(ไร่)
เหนือ	2,414,043
กลาง	2,992,584
ตะวันออกเฉียงเหนือ	4,566,133
ตะวันออก	558,167
รวมทั้งประเทศ	10,530,927

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปีการผลิต 2557/58 (รายงาน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

ภาค	ปริมาณอ้อยส่งโรงงาน (ตัน)			CCS	ปริมาณ น้ำตาลทราย (ตัน)	น้ำตาล/ ตันอ้อย (กก.)
	อ้อยสด	อ้อยไฟไหม้	รวม			
เหนือ	7,384,107.860	17,998,881.110	25,382,988.970	11.89	2,631,277.490	103.66
กลาง	9,234,757.630	18,765,564.360	28,000,321.990	11.45	2,818,934.761	100.68
ตะวันออกเฉียงเหนือ	19,028,130.290	28,337,975.375	47,366,105.665	12.93	5,305,667.547	112.01
ตะวันออก	1,263,624.310	3,946,017.050	5,209,641.360	11.74	546,118.530	104.83
รวมทั้งประเทศ	36,910,620.090	69,048,437.895	105,959,057.985	12.23	11,301,998.327	106.66

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



	ปริมาณอ้อย ส่งโรงงาน	พื้นที่ปลูก2557/58	ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
เหนือ	25,382,989	2,414,043	10.51
กลาง	28,000,322	2,992,584	9.35
ตะวันออกเฉียงเหนือ	47,366,106	4,666,133	10.15
ตะวันออก	5,209,641	558,167	9.33



ลักษณะทั่วไป

- อ้อย เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นมีปล้องชัดเจน
- ใบเกิดสลับข้างกัน มีกาบหุ้มลำต้น กาบใบมีไขและขน
- อ้อย เป็นระบบรากฝอย ชอบแดดจัด อากาศร้อนชื้น
- อ้อย เติบโตได้ดีในดินทุกชนิดที่ระบายน้ำดี
- ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือนต้องการอากาศเย็น เพื่อสะสมน้ำตาล
- อายุเก็บเกี่ยว 10-13 เดือน





พันธุ์ที่นิยมปลูก



ชื่อพันธุ์ LK 9211

ลักษณะประจำพันธุ์

ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบกับ 19-34% และให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยตัน ซี.ซี.เอสต่อไร่สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบกับ 24-55% และมีความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคไส้ดำ โรคกอตะไคร้ โรคกลั่น ลับประดแต่อ่อนแอต่อโรคใบขาว รวมทั้งมีความต้านทานต่อหนอนเจาะยอด หนอนเจาะลำต้น และแมลงหิวขาว โดยมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ

13 เดือน

ที่มา:การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ครั้งที่ 6





ข้อพันธุ์ อู่ทอง3

ลักษณะประจำพันธุ์

ให้ผลผลิตน้ำหนักรากและน้ำตาลสูง อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงไม่แนะนำให้ปลูกในแหล่งที่มีโรคนี้ระบาด ได้แก่ ในพื้นที่ดินนาสภาพน้ำขังเช่นที่ **อ่างทอง สุพรรณบุรี** บางพื้นที่และพบโรคใบขีดแดงและยอดเน่าในสภาพธรรมชาติ



ที่มา: กรมวิชาการเกษตร



ข้อพันธุ์ ขอนแก่น3

ลักษณะประจำพันธุ์

ผลผลิตสูง การไว้ตอดี กอตั้งตรง
ลำใหญ่ อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง ไม่แนะนำ
ให้ปลูกในแหล่งที่มีโรคนี้ระบาดหรือในพื้นที่
ที่ดินนาสภาพน้ำขัง เช่นที่ **สิงห์บุรี อ่างทอง**
สุพรรณบุรี บางพื้นที่ และพบโรคใบขีดแดง
และยอดเน่าในสภาพธรรมชาติ



ที่มา: กรมวิชาการเกษตร



การคัดเลือกพันธุ์ อ้อย



อู่ทอง 1



อู่ทอง 3

เกษตรกรควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ควรจะเป็นพันธุ์ที่การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวง่าย ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และให้ค่าความหวาน (CCS) สูง เช่น เค 84-200 แอดเค 9211 เกษตรศาสตร์ 60 อู่ทอง 1 และ อู่ทอง 3 ขอนแก่น 3 เป็นต้น



ปฏิทินการเพาะปลูก

เดือน

พืช	ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย
อ้อย ปลาย ฝน (ข้าม แล้ง)	ปลูก																		
อ้อย ต้น ฝน					ปลูก														



การเตรียมดิน



การไถดะ ไถแปร





การไถยกร่องปลูก



ควรเปิดร่องให้กว้าง



การเตรียมท่อนพันธุ์



การเตรียมท่อนพันธุ์

- ควรเป็นอ้อยปลูกใหม่ อายุ 8-10 เดือน ลักษณะตรงตามพันธุ์
- คัดท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยจากโรคและแมลงเข้าทำลาย
- ลักษณะตาอ้อยสมบูรณ์ (ควรมีกาบใบหุ้มตาเพื่อป้องกันตาอ้อยชำรุด)
- ขนาดของท่อนพันธุ์ปลูกควรมีตาอ้อยประมาณ 2-3 ตา





ลักษณะท่อนพันธุ์ดี

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การเตรียมท่อนพันธุ์





การฉีดพ่นพ่นปุ๋ยก่อนปลูกเพื่อ เร่งการงอก กำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์



200 ซีซี



400 ซีซี



100 ซีซี



50 ซีซี

ต่อน้ำ 200 ลิตร

**พ่นใส่กองท่อนพันธุ์ที่ตัดไว้ก่อนยกขึ้นรถหรือยกไปปลูก มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การปลูกอ้อย



วิธีการปลูก

1. ใช้แรงงานคนปลูก

- ☐ ยกร่องปลูก ระยะห่างระหว่างสันร่อง 1-1.5 เมตร
- ☐ วางท่อนพันธุ์ (แบบเรียงเดี่ยวหรือเรียงคู่)
- ☐ ปลูกช่วงต้นฝนกลบหน้าดินหนา 3-5 เซนติเมตร
- ☐ ปลูกช่วงปลายฝนควรกลบหน้าดินหนาเพิ่มขึ้น 2 เท่า





วิธีการปลูก

2. ใช้เครื่องจักรกลปลูก

- ☐ ประหยัดเวลา แรงงาน ปลูกได้วันละ 8-10 ไร่
- ☐ ควรมีการปรับระดับพื้น และการเตรียมดินที่ดี





เทคนิคการเพิ่มผลผลิต



การใส่ปุ๋ยทางดิน



ควรเลือกปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมตามระยะการเจริญเติบโตของอ้อย
มีธาตุอาหารที่สำคัญครบถ้วนในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ ตรงตามชนิดดินปลูก

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การใส่ปุ๋ยแบบหวานทางดิน

รองพื้น	เพิ่มการแตกกอ		สร้างลำ ยึดข้อปล้อง	
	1 เดือน	3 เดือน	5 เดือน	12 เดือน
25-7-7	46-0-0	13-13-21		
30-5-5	21-0-0	15-15-15		
12-10-8	15-15-15	16-16-16		
16-20-0	16-16-16			
16-8-8	20-4-30			
	16-11-14			



การใส่ปุ๋ยแบบหวานทางดิน



1 กระสอบ



1 ขวด



500 กรัม

กรณีดินแข็งแน่นดาน
สภาพกรด-ด่างไม่เหมาะสม



วิธีการปลูกอ้อยมิกซ์

1. ไม้กวาน



เขย่า



2. ราด



3. คลุก



5. หว่าน



หรือ ละลายน้ำฉีด



4. เก็บ 1 วัน





การใส่ปุ๋ยแบบหว่านทางดิน

การใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก



อัตราใช้ 25-50 กิโลกรัมต่อไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า (อ้อยอายุ 3-5 เดือน)



อัตราใช้ 25 กิโลกรัมต่อไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การใส่ปุ๋ยแบบฉีดลงโคนประหยัดปุ๋ยเคมี

1. ปุ๋ยรองพื้น (ก่อนหรือพร้อมปลูก) 25 กก./ไร่
2. ฉีดใส่โคน
 - 2.1 อ้อยอายุ 1 เดือน 46-0-0 ผสม ไอ้ค่อมิกซ์ อัตรา 5 กก./น้ำ 200 ลิตร /พื้นที่ 2 ไร่
 - 2.2 อ้อยอายุ 2-3 เดือน 25-7-7 หรือ 30-5-5 ผสมไอ้ค่อมิกซ์ อัตรา 10 กก./น้ำ 200 ลิตร /พื้นที่ 2 ไร่
 - 2.3 อ้อยอายุ > 4 เดือน 13-13-21 ผสม ไอ้ค่อมิกซ์ อัตรา 15 กก./น้ำ 200 ลิตร /พื้นที่ 2 ไร่







วิธีการใช้ผสมปุ๋ยกับอีโคมิคซ์ แล้วนำไปฉีดพ่นลงโคนหรือใส่ใบ





การใช้ปุ๋ยผสมอีโคมิคซ์ฉีดพ่น



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การให้ปุ๋ยทางใบ



เพิ่มผลผลิตและช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารในกรณีที่อ้อยไม่สามารถดูดกินธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ
เช่น ดินด่าง แล้งและร้อนจัด ศัตรูพืชระบาดโดยเฉพาะด้วงหนวดยาว ฯลฯ

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อ้อยอายุ 1-3 เดือน



22/03/2011 17:26



อ้อย 1-3 เดือน



200 ซีซี



500 กรัม



ดินกรวดปูนมาก



400 ซีซี



ดินสมบูรณ์ดี



200 ซีซี

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



หลังใช้



อ้อยเขียว อย่างปล้องดี
ทนแล้งได้ เจริญเติบโตดีกว่า



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อ้อยอายุ 3-4 เดือน



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อ้อย 3-4 เดือน



200 ซีซี



500 กรัม



200 ซีซี



200 ซีซี

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การกำจัดวัชพืช



เทคนิคการเลือกใช้สารกำจัดวัชพืช

1. การคุม-ฆ่าวัชพืชหลังปลูก



2. การเก็บวัชพืชระหว่างแถวปลูก



คุม-ฆ่าหญ้า

คุมแห้ง (ดินไม่มีความชื้น)



2 ลิตร



200 กรัม

คุม-ฆ่าหญ้า (ดินมีความชื้น)



0.5 ชอง



1 ชอง

ฉีดทันทีหลังจากปลูกอ้อย

ฉีดหลังวัชพีชงออก

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อ้อยโต กลุ่มแห้งด้วย



1 ขวด ต่อพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



คุม-ฆ่าหญ้า



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



คุม-ฆ่าหญ้า และ มีหญ้าเถาหรือหัวหมู

คุมเปียก (ดินมีความชื้น)



1 ซอง



1 ซอง



500 ซีซี

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ฉีดหลังวัชพืชงอก มีใบแต่ไม่แก่มาก

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



เก็บหญ้าระหว่างร่องปลูก



1 ลิตร



5-10 กก.

กำจัดหญ้าระหว่างร่องปลูกไปพร้อมกับการฟื้นฟูสภาพดินอ้อย

ต่อน้ำ 200 ลิตร // ฉีดพ่นได้ 2-3 ไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร






โรคอ้อย และการป้องกันกำจัด



โรคเส้ดำ



เลือกปลูกพันธุ์ต้านทานโรค เช่น อุ่ทอง1, อุ่ทอง2, อุ่ทอง3



200-300 ซีซี

PHI = 21 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



โรคเหี่ยวน้ำตาล



เกิดจากเชื้อรา อ้อยจะเริ่มเหี่ยวเหลืองต่อมา
จะยืนต้นแห้งเป็นลำ ทยอยตายทั้งกอและ
ลุกลามตายทั้งแปลงเมื่อผ่าเนื้อในเน่าแห้งอาจ
มีสีแดงหรือม่วงปนเทา มีเชื้อราสีขาวและเทาฟู
อยู่ในเนื้ออ้อยเชื้อสามารถระบาดได้โดยเชื้อรา
ปลิวไปกับ ลม ฝน และน้ำชลประทาน



การป้องกันกำจัด โรคเหี่ยวเน่าแดง



200 ซีซี

PHI = 21 วัน



200 ซีซี

PHI = 7-14 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



โรคใบขาว ในอ้อย



เกิดจากเชื้อ โฟโตพลาสมา เกิดได้กับอ้อยทุกระยะ
โดยสามารถระบาดไปกับท่อนพันธุ์, เพี้ยจักจั่น

ป้องกันโดยใช้พันธุ์ต้านทาน

**ไม่มียารักษาหากพบการระบาดให้ทำลายอ้อยทิ้ง
ทันที**





แมลงศัตรูอ้อย และการป้องกันกำจัด




หนอนกอ



เมื่อหนอนกอทำลายจะทำให้เกิดอาการ
ยอดแห้ง ลำต้นแห้งตาย หากหนอนเข้า
ทำลายที่โคนลำจะมีรอยเจาะเป็นรู หากผ่าลำ
ดูจะพบว่า มีหนอนอยู่ข้างใน





หนอนกอทำลาย

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การป้องกันกำจัด หนอนกอ



หรือ



หรือ



หรือ



400 ซีซี

PHI = 7 วัน

300 ซีซี

PHI = 7 วัน

300-500 ซีซี

PHI = 7-14 วัน

600-800 ซีซี

PHI = 15 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



เพลี้ยแป้ง



ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณข้อ และลำ
ต้นอ้อยที่ห่อหุ้มด้วยกาบใบเป็นส่วน
ใหญ่ทำให้อ้อยไม่สมบูรณ์มีคุณภาพ
และปริมาณน้ำตาลลดลง



การป้องกันกำจัด เพลี้ยแป้ง



100 ซีซี

PHI = 3 วัน



150 ซีซี

PHI = 1 วัน

หรือ



20 กรัม

PHI = 7 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย



เพลี้ยอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบอ่อน
เพลี้ยหอย ดูดกินน้ำเลี้ยงได้ในระดับลึก
เพราะมีปากที่ยาวมากเป็นเส้นเล็ก ๆ ใน
ระหว่างการชอนไชของปลายปากจะ
ปล่อยน้ำลายที่เป็นพิษด้วย



การป้องกันกำจัด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย



100 ซีซี

PHI = 3 วัน



150 ซีซี

PHI = 1 วัน

หรือ



20 กรัม

PHI = 7 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ด้วงหนวดยาว



ด้วงหนวดยาว เข้าทำลายทางโคนต้น
ไต่ดินแล้วเจาะไชเข้ากัดกินภายในลำต้น
กัดกินหน่ออ่อนส่วนโคนจนขาดทำให้
แห้งตาย



การป้องกันกำจัด ตั๊กแตนลาย



300 ซีซี

PHI = 7 วัน



300 ซีซี

PHI = 7-14 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



แมลงนูนหลวง



ตัวเต็มวัยเพศเมียและไข่



ตัวหนอน แมลงนูนหลวง

หนอนแมลงนูนกัดกินรากอ้อย และรากมันลำปะหัง อ้อยเกิด
อาการคล้ายขาดน้ำ คือ ใบเหี่ยวและแห้งตาย



การป้องกันกำจัด แมลงนูนหลวง



500 ซีซี

PHI = 7 วัน

หรือ



500 ซีซี

PHI = 7-14 วัน

หรือ



500 ซีซี

PHI = 15 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ต้นทุนอ้อย ต่อไร่	ต้นทุนแบบเดิม	ต้นทุนแบบยูนิไลฟ์
1. ไร่	700	700
2. ค่าท่อนพันธุ์	1,000	1,000
3. ฉีดท่อนพันธุ์	-	250
4. ค่าปลูก	300	300
5. กำจัดวัชพืช	580	580
6. การให้ปุ๋ย 2 ครั้ง (800 บ./กระสอบ)	2,400 (3 กระสอบ)	2,780 (2 กระสอบ + อีโคมิคซ์ 2 ขวด)
	4,980	5,610

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ต้นทุนอ้อย ต่อไร่	ต้นทุนแบบเดิม	ต้นทุนแบบยูนิไลฟ์
ผลผลิต	12 ตัน	18 ตัน
รวมต้นทุนการผลิต	4,980	5,610
ประมาณการราคาผลผลิต ขั้นต่ำ 800 บาท/ตัน	9,600 บาท	14,400 บาท
ผลผลิตที่ได้ – ต้นทุนการผลิต / ไร่	4,620 บาท	8,790 บาท



ผลผลิต คือ บทพิสูจน์



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณประเสริฐ จิตทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 081-6800074

ปลูกอ้อยผ่าแล้ง แปลงข้างๆตายหมด

แต่แปลงนี้รอด ผลผลิต 28 ตันต่อไร่ ลำใหญ่ ใบเขียวเพราะใช้อิโคมิกรีบผม

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณเสนาะ สวัสดิ์ จ.พิษณุโลก

ใช้ อีโคมิกซ์ผสมปุ๋ยเคมี นำปุ๋ย 5 กก.ผสมน้ำฉีดลงโคนอ้อย ฉีดพ่น 2 ครั้ง
อ้อยเขียว ทนแล้ง เทียบกับแปลงข้างๆแห้งตาย

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณวัชร เมฆวิสัย โทรศัพท์ 089-7038231

ปลูก 30 ไร่ เก็บผลผลิตได้ 23-25 ตันต่อไร่ไม่เคยได้น้อยกว่านี้ค่ะ

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมทางการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณอนงค์ นามแสง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 088-9068485

ใช้ อีโคมิक्सผสมปุ๋ยเคมี 5 กก. ผสมน้ำฉีดลงโคนอ้อย ฉีด 2 ครั้ง

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณวิเชียร ชำรวัย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 089-6449048

ทางดิน ใช้ อีโคมิคซ์ผสมปุ๋ยเคมี ผสมน้ำฉีดลงโคน ทางใบใช้ ซีวิว ฉีดพ่น

อ้อยผ่าแล้งแต่ใบไม่เหลือง กอใหญ่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



อ่าวสด

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร