



เตือนภัยเกษตรกร

โดย.. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้



ยูนิไลฟ์

Call Center

02-399-5555

www.unilife.co.th



รู้ไว้ก่อน ป้องกันได้
ไม่สูญเสียผลผลิต จากภัยต่างๆ ที่มีความเสี่ยงให้เกิดความเสียหายต่อพืช
โดย...ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร



เตือนภัย “หนอนเจาะดอกกุหลาบ (หนอนกระทู้หอม)”

หนอนกระทู้หอม ตัวเมียวางไข่ประมาณ 20-80 ฟอง มีใบสีเขียวคลุม วางไข่ระหว่าง 16.00-20.00 น. ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนภายใน 72 ชั่วโมง ตัวหนอนมี 6 วัย ตัวหนอนมีลำตัวตรงราบเรียบเท่ากันตลอดตั้งแต่หัวถึงท้ายลำตัว มีแถบสีขาวข้างลำตัว แถบสีมีได้หลายสี ด้วยกัน หนอนโตเต็มที่ยาว 2.5 เซนติเมตร ระยะหนอน 14-17 วัน เข้าดักได้ในดิน 5-7 วัน ก็เป็นผีเสื้อขนาดกางปีกกว้าง 2.0-2.5 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลแก่ปนเทา มีจุดสีน้ำตาลอ่อน 2 จุดตรงกลางปีก ปีกคู่หลังมีสีขาวขุ่น ตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้หลายร้อยฟอง พืชอาหารหนอนกระทู้หอมมีพืชอาหารมากมาย ใบไม้ดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง เบญจมาศ กล้ายไม้ มะลิ เยอบีร่า แกลดิโอลัส ฯ ในพืชผัก ตระกูลกระหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลพริก-มะเขือ หนอนไม่ฟรังในพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วต่างๆ แมกกระทู้ในองุ่น

การป้องกันกำจัด

1. ใช้กับดักแสงไฟ ช่วงเวลา 18.00-22.00 น. เพื่อกำจัดผีเสื้อหนอนกระทู้หอม
2. ใช้มุ้งตาข่ายไนล่อนคลุมแปลง แต่เป็นการลงทุนสูงต้องคำนวณผลตอบแทนว่าคุ้มดีขนาดไหน
3. ใช้เชื้อไวรัส (NPV) ฉีดพ่นที่พืชเพื่อให้หนอนกระทู้หนอนกินเข้าไป จะใช้เวลา 2-3 วัน จึงเห็นผล และใช้ได้เฉพาะกับหนอนกระทู้หอมเท่านั้น หนอนชนิดอื่นจะไม่ได้ผล
4. การใช้สารเคมีควรสำรวจแปลงพืชก่อนตัดสินใจ เช่น **แมมมอท ฟิฟเปอร์ นิวทริน55 ไฮนิว20 ไชปรอย35** ควรเว้นระยะก่อนการตัดดอกตามชนิดของสาร

